

PILOMATRICOME GEANT A LOCALISATION PAROTIDIENNE : A PROPOS D'UNE OBSERVATION

N D N'guessan, A Salami, A R Yapo, C Assouan, K E Anzouan, E Konan.
Service de Chirurgie Maxillo-faciale et Stomatologie CHU de Treichville Abidjan RCI
dndia@hotmail.com

INTRODUCTION

Le pilomatricome (épithélioma calcifié de Malherbe) :

- est la plus fréquente des tumeurs du follicule pileux
- se présente habituellement comme un petit nodule de 1cm, ferme ou induré, profond dermique ou sous cutané plus ou moins saillant

OBJECTIF

Présenter un cas de pilomatricome géant à localisation parotidienne


OBSERVATION

Patient de 28 ans, reçu en consultation pour volumineuse tumeur ulcéro-nécrotique de la région parotidienne de 30cm x 12cm évoluant depuis plus de 10 ans




Tumeur vue en consultation

Le diagnostic a fait appel à la tomodensitométrie et à la biopsie.



TDM

Le traitement a consisté à une exérèse tumorale emportant le lobe superficiel de la parotide suivie d'une cicatrisation dirigée puis d'une greffe de peau.



Exérèse tumorale, pièce opératoire, cicatrisation dirigée greffe de peau

Les suites ont été simples et le patient a été perdu de vue après une année.

DISCUSSION

Le pilomatricome est une tumeur annexielle bénigne développée à partir de la matrice du poil.

Il touche le plus souvent l'enfant.

Les localisations préférentielles sont le cou, les régions pré-auriculaires et peri-orbitaire.

Chez notre patient le diagnostic de tumeur maligne parotidienne a été éliminé après l'étape de l'histologie.

Le traitement est essentiellement chirurgical seul garant d'un bon pronostic

Aucun conflit d'intérêt