

# Lipome de la parotide

## Cas clinique

S. BENKOUISSEM ,H. Ikhlef, A. Benhmad, D. Slimani, M. Boulanane  
Service de chirurgie Maxillo-faciale – C.H.U. de Bejaia  
Email: samia.benkouissem@univ-bejaia.dz

### Introduction

- Les lipomes de la glande parotide sont des tumeurs bénignes qui se développent à partir du tissu graisseux de la glande
- Une pathologie très rare 0,6 à 4,4 %
- Leur diagnostic est clinique et radiologique allant de la simple échographie jusqu'à la tomodensitométrie, voir l'imagerie par résonance magnétique
- Le traitement est chirurgical avec étude histologique de la pièce opératoire

### Cas clinique

- Il s'agit de Monsieur O.M. âgé de 59 ans, suivi pour psychose et qui présente une tuméfaction molle volumineuse : 8 cm de diamètre du pôle inférieure de la parotide gauche chronique (évolution depuis plus de 2 ans)
- Sans signes de malignité clinique : pas de paralysie faciale, pas de douleur
- L'exploration a été faite par tomodensitométrie qui confirme la localisation et la nature graisseuse de la tuméfaction
- L'exérèse chirurgicale du lipome été complète : énucléation de la masse
- Les suites opératoires étaient simples
- L'étude histologique de la pièce opératoire a confirmé le diagnostic : lipome classique mature bien encapsulé



### Discussion

- Tumeurs bénignes d'évolution lente : le diagnostic clinique est trompeur devant l'induration de la masse
- Le diagnostic repose sur la TDM ou L'IRM (fiabilité proche de 100%)
- Le traitement est chirurgical mais les modalités sont très controversés :
  - Parotidectomie exofaciale
  - Parotidectomie polaire inférieure
  - Enucléation
  - Parotidectomie totale conservatrice dans tout les cas

### Conclusion

Pathologie rare

Le diagnostic clinique est parfois difficile mais la pathologie reste de bon pronostic

### Bibliographie :

Pan afr. led j2017. p28-47.

Annales françaises ORL et de pathologie cervico-faciale, vol 130. num 45-2013.