



## ANGIOME EN BARBE : EXPERIENCE DU SERVICE DE CHIRURGIE MAXILLO FACIALE ET ESTHETIQUE DE MARRAKECH

WAA. Yanogo\*a (Dr), A. Garangoa (Dr), J. Kharboucha (Dr), M. Elbouihi (Pr), N. Mansouri Hattaba (Pr)  
*Service de chirurgie maxillo-faciale et esthétique. CHU Mohammed VI Marrakech. Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech. Université Cadi Ayyad*

Auteur correspondant : Dr Wendpouiré Armel Aristide YANOGO  
 E-mail : armelyanogo@yahoo.fr

### INTRODUCTION

Classé comme malformation vasculaire par l'IVSSA, la prise en charge des malformations veineuses dites en barbe demeure délicate, non consensuelle. Elle est axée sur des thérapies non invasives voir plus agressives (chirurgie +++)

### BUT

Asseoir la place de la chirurgie dans la prise en charge de cette entité pathologique

### PATIENTS ET METHODE

Il s'est agi d'une étude descriptive et rétrospective incluant 5 cas de malformations veineuses « en barbe » colligés au service de chirurgie maxillo-faciale et esthétique du CHU MOHAMMED VI étalée sur une période de 9 ans allant de 2008 à 2017

### RESULTATS

L'âge moyen de nos patients était de 34 ans avec une nette prédominance masculine (80%).

Une chirurgie modelante a été réalisée chez tous les patients

Aucune complication postopératoire n'a été objectivée.

### Observation 1: patiente ayant bénéficié d'une vermillectomie



### Observation 2: plastie en Z en per opératoire



### Observation 3: exérèse-suture avec résultat en per opératoire



### DISCUSSION

L'intérêt de la chirurgie est la correction des dysmorphies fonctionnelles et esthétiques induites par la malformation. Ainsi donc il s'agit d'une chirurgie qui se doit d'être modelante et non carcinologique. Dans certains cas, la chirurgie peut-être associée à une sclérothérapie préalable. Le choix de la technique dépend de plusieurs facteurs (anatomique, taille, orientation, caractère évolutif) allant de l'exérèse-suture à la réalisation de véritables lambeaux avec nécessité d'une réduction en plusieurs temps opératoires

### CONCLUSION

Bien que la sclérothérapie demeure le gold standard du traitement des angiomes en barbe, la chirurgie demeure une alternative intéressante.

**Mots clés :** angiome, malformation veineuse, sclérothérapie percutanée

**Pas de conflit d'intérêt**

### REFERENCE

- 1 DEGARDIN-CAPON N, MARTINOT-DUQUENNOY V, PATENOTRE P, BREVIERE G-M, PIETTE F, PELLERIN P. Le traitement chirurgical précoce des hémangiomes cutanés. Annales de chirurgie plastique esthétique 51 (2006) 321-329.
- 2 BARBIER C, MARTIN A, PAPANAGIANNAKI C, COTTIER J-P, LORETTE G, HERBRETEAU D. Malformations veineuses superficielles ou « angiomes veineux ». Presse Med 2010;39:471-81.
- 3 ENJOLRAS O.R. Angiomes : hémangiomes et malformations vasculaires. Encycl Med Chir (Elsevier, Paris), Dermatologie 1996 :12-715-A10.