

Reconstruction labiale par deux lambeaux nasogéniens à pédicule inférieur



S. Hammami Zribi^{*a} (Dr), M. Dhouib^a (Pr), A. Bouattour^b (Dr), F. Karray^a (Pr), M. Abdelmoula^a (Pr)

^a Hopital Habib bourguiba -Service de Chirurgie maxillofaciale et esthétique, Sfax, Tunisie ;

^b Hopital Habib bourguiba -Service de Chirurgie maxillofaciale et esthétique, Sfax, Tunisie

* sandra.hammami@gmail.com

** Tous les auteurs de cette communication déclarent qu'il n'existe aucun conflit d'intérêt.

INTRODUCTION:

Le lambeau naso-génien (LNG) est un lambeau musculo-cutané pédiculé sur l'artère faciale. Il est fiable, très plastique et parfaitement adapté à la reconstruction en un temps des pertes de substance labiales ou facio-cutanées.

OBJECTIFS:

Intérêt du LNG dans la reconstruction des pertes de substance étendues de la lèvre supérieure avec un minimum de séquelles fonctionnelles et esthétiques.

MATERIELS ET METHODES :

Il s'agit d'une patiente âgée de 65 ans, sans antécédents pathologiques, pas de tabac ni d'alcool dans ses habitudes; qui consulte pour une masse bourgeonnante prenant toute la lèvre rouge supérieure avec extension à la muqueuse labiale en interne et à la peau en externe. L'examen anatomopathologique montrait un carcinome épidermoïde de type verruqueux. Cette tumeur était classée T4aN0M0 suite à un bilan d'extension. On a opté pour une exérèse tumorale avec marge de 7 mm puis une reconstruction labiale totale cutanée et muqueuse par deux LNG à pédicule inférieur qui ont été chevauchés afin de couvrir toute la perte de substance. Le résultat esthétique et fonctionnel était très satisfaisant avec une bonne continence labiale.



Figure 1 :Aspect pré op

Figure 2: Aspect pré op

Figure 3: Exérèse tumorale



Figure 4: Prélèvement des 2 LNG

Figure 5: MEP des lambeaux

Figure 6: Aspect post op immédiat



DISCUSSION:

La symétrie de la lèvre supérieure et ses rapports intimes avec la base du nez rendent sa reconstruction délicate. Quant à la lèvre rouge il y a la nécessité d'une reconstruction cutanéomusculo-muqueuse. Le LNG à pédicule inférieur permet une reconstruction avec une peau de voisinage de bonne qualité. Une réparation à partir de ce lambeau permet une réparation assez étendue vers la ligne médiane. Ce lambeau donne peu de séquelle cicatricielle au niveau de la joue. Il permet une reconstruction totale de la lèvre supérieure. Taillé dans le sillon nasogénien, son pédicule est inférieur ce qui permet une reconstruction de la sangle orbiculaire en horizontalisant les fibres musculaires situées dans le lambeau.

BIBLIOGRAPHIE:

1/ATLAS D'ACCES LIBRE EN CHIRURGIE ORL ET CERVICO-FACIALE LAMBEAU NASO-GENIEN POUR LA RECONSTRUCTION BUCCO-PHARYNGEE Harry Wright, Scott Stephan, James Netterville

2/Chirurgie des tumeurs des lèvres J.-P. Bessedé, J.-P. Sannajust, V. Vergnolles

3/Guichard S. Chirurgie des tumeurs cutanées. Encycl Méd Chir (Elsevier SAS, Paris), Techniques chirurgicales - Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, 45-140, 1999 : 17p