

Adénome pléomorphe du palais : à propos d'un cas

Tamba B**, Diatta M**, Gassama BC*, Ba A*, Kounta A*, Kane M*, DiaTine S**

* Service de Chirurgie Buccale / Institut d'Odonto-Stomatologie / Université Cheikh Anta Diop / Dakar- Sénégal

** Service d'Odonto-Stomatologie / Hôpital Général de Grand-Yoff/ Dakar- Sénégal

INTRODUCTION L'adénome pléomorphe est une tumeur bénigne se développant au dépend des glandes salivaires accessoires localisées au niveau du palais¹. Le cas rapporté était celui d'une patiente de 22 ans référée par un chirurgien-dentiste pour tuméfaction palatine évoluant depuis deux ans.

OBSERVATION CLINIQUE



Masse ovoïde dépassant les tables occlusales des dents, muqueuse saine



TDM / coupe axiale: image homogène, limites nettes, léger amincissement os palatin



Exérèse masse tumorale par dissection de sous anesthésie générale



Os palatin mis à nu




Pièce opératoire



Mise en place silicone en per opératoire



Contrôle un an après



Cellules épithéliales et adipeuses + Stroma

COMMENTAIRES

L'adénome pléomorphe siège au niveau palatin dans Cette tumeur évolue sans symptomatologie expliquant la consultation tardive. L'importance de son volume entraine une gêne fonctionnelle². Il est à différentier des tumeurs malignes des glandes salivaires accessoires comme le carcinome adénoïde kystique, le carcinome muco-épidermoïde ou l'adénocarcinome polymorphe. La plaque palatine en per et post opératoire permet de protéger la plaie opératoire mais aussi de guider la cicatrisation³.

REFERENCES 1. Barnes I. Tumours pathology and genetics of head and Neck. WHO Classification 2005;435p.

2. Yadav AB. Basal cell adenoma of palate, a rare occurrence with review of litterature. *J Dent* 2015;16(3):291-5.

3. Arumugam P. Pleomorphic adenoma of the palate: a case report. *Cureus* 2019;11(3):e4308.