

# Rhinophyma

Fettal F. Kabbaj H .jaifi A. El bouihi M . Mansouri N

Service de chirurgie maxillo-faciale, CHU Mohamed VI, Marrakech



## Introduction

- Le rhinophyma: Pathologie rare , inesthétique intéressant la peau du nez
- possibilité de transformation maligne.
- physiopathologie : mal définie
- PEC: Plusieurs consensus

## Matériels et méthodes:

Nous rapportons 5 cas de rhinophyma de 2017 à 2019 Pris en charge chirurgicalement au service de CMF/CHU Mohamed VI, Marrakech.

## Résultats:

- Sur les 5 cas ,Tous nos patients sont de sexe masculin
- L'âge moyen :60 ans
- L'évolution a duré en moyenne 3 ans
- L'exposition solaire :Fréquente
- L'Alcoolisme: patients
- PEC: dérmabrasion avec décortication,
- Etude anatomopathologique : hypertrophie des glandes sébacées et la dilatation veino-lymphatique .



**Figure 1:**  
Rhinophyma avant la chirurgie résultat après 6mois

## Discussion:

- pathologie du sujet âgé
- Habitudes de vie: alcool
- Evolution lente
- La chirurgie :seul traitement efficace
- étude anatomopathologique systématique: risque d'association à un CBC
- Plusieurs procédés thérapeutiques , essentiellement dérmabrasion avec cicatrisation dirigée

## Conclusion :

Le rhinophyma :stade final rosacée  
localisation: dommages esthétiques / psychologiques.  
PEC chirurgicale  
L'étude anatomopathologique systématique